

Manosan®

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie vor der Einnahme von Manosan® diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch!

Manosan® ist ein registriertes Medizinprodukt, das für die Prävention und unterstützende Behandlung einer unkomplizierten Zystitis indiziert ist. Manosan® kann die am häufigsten auftretenden Symptome bei Infekten der unteren Harnwege lindern (Brennen beim Wasserlassen, Harndrang, häufiges Wasserlassen, usw.), wenn diese durch Bakterien vom Typ E.coli verursacht werden.

Was ist Manosan®?

Manosan® Tabletten enthalten D-Mannose.

D-Mannose ist ein in der Natur vorkommender natürlicher Zucker. Auf Grund seiner besonderen Beschaffenheit wird D-Mannose vom menschlichen Körper nicht verwertet und praktisch unverändert wieder über die Nieren in den Blasen- und Harntrakt ausgeschieden.

Hauptwirkung von Manosan® Tabletten:

Manosan® ist ein Produkt mit dem Wirkstoff D-Mannose. Eine Tablette enthält 1000 mg D-Mannose. D-Mannose stellt im Medizinprodukt Manosan® den bestimmungsgemäßen Hauptwirkstoff mit physikalischer Wirkung dar.

D-Mannose hemmt in der Blase kompetitiv die Anheftung Mannose-sensitiver Bakterien. Dabei werden die Bakterien an einer Bindung an die Epithelzellen der Harnwege wirksam gehindert. D-Mannose kann somit die Bindung der E.coli-Bakterien an die Epithelzellen der Blasenschleimhaut beeinträchtigen und so ein Eindringen der Erreger verhindern.

Da sich die E.coli-Bakterien nicht mehr an den Epithelzellen der Blasenschleimhaut festsetzen können, werden sie beim nächsten Wasserlassen hinausgespült. Eine Blasenentzündung mit E.coli-Bakterien kann so verhindert werden.

Eine Resistenzbildung, wie sie beim Einsatz von Antibiotika vorkommen kann, ist von D-Mannose nicht bekannt.

Anwendung:

Zur Vorbeugung zweimal am Tag 1 Tablette, im akuten Fall bis zu 6 Tabletten über den Tag verteilt (2x morgens, 2x Mittags, 2x Abends) kauen oder mit einem Glas Wasser einnehmen. Die Einnahme ist sehr praktisch, schlucken Sie die Tablette mit einem Glas Wasser oder zerkauen Sie die Tablette, dann ist die Einnahme auch ohne Wasser möglich.

Eine Überdosierung von Manosan® Tabletten verbessert die Wirkung nicht und kann zu möglichen Nebenwirkungen führen.

Im Einklang mit den Medizinproduktrichtlinien 93/42/EWG wird empfohlen, nach 30 Tagen der Einnahme von Manosan® jeweils eine Pause von 3 - 5 Tagen ohne Einnahme einzuhalten.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren
- Verwenden Sie dieses Produkt während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Das Präparat darf nicht eingenommen werden bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber D-Mannose.
- Diabetiker sollten bei regelmäßiger Einnahme von Manosan® ihren Blutzuckerspiegel mehrmals täglich kontrollieren und ggfs. Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten.
- Diarrhö kann als mögliche Nebenwirkung auftreten.
- Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, zögern Sie nicht, Ihren Arzt oder Apotheker anzusprechen.

Sollte 2 - 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung eingetreten sein oder sollten sich die Symptome erheblich verschlechtert haben (wie z.B. bei Auftreten von Fieber ab 38°C), suchen Sie bitte einen Arzt auf!

Warnhinweise:

Ist das angegebene Verfallsdatum überschritten, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Manosan muss trocken und unter 25° C gelagert werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Weitere Hinweise:

Manosan® ist ein registriertes Medizinprodukt. In einem Konformitätsbewertungsverfahren für Medizinprodukte wurde die Wirksamkeit und Sicherheit nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

Das Produkt wird in Deutschland hergestellt.

Zusammensetzung:

Wirkstoff: D-Mannose (1000 mg)

Hilfsstoffe: Mikrokristalline Cellulose, Sorbitol, Tricalciumphosphat, Polyethylenglycol, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren

Manosan® enthält keine Lactose, Gluten, Gelatine, Salz und Konservierungsstoffe.

Für Veganer geeignet.

Aufbewahrung:

Kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwendbar bis:

Siehe Angabe auf der Verpackung

Packungsgrößen:

Manosan® ist als OP mit 30 Tabletten PZN 16015305 und 60 Tabletten PZN 16015311 erhältlich.

Entsorgung:

Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Hersteller:

Vertrieb:

Nutrin GmbH
Schnaid 36b
D-91352 Hallerndorf
Deutschland

Fontapharm AG
Varrel 21
D-31303 Burgdorf
Deutschland

Manosan® ist ein Apothekenexklusives Medizinprodukt der Fontapharm AG.

CE 0481

Stand der Information: Mai 2020



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Medizinprodukt



Chargenbezeichnung

Am häufigsten sind Frauen von einer unkomplizierten Harnwegsentzündung betroffen, da ihre Harnröhre kürzer ist und die anatomischen Verhältnisse eine Keimbesiedelung der Blase begünstigen.

Jede zweite Frau hat mindestens einmal im Leben eine unkomplizierte Harnwegsinfektion. Auslöser sind Bakterien, in den meisten Fällen handelt es sich um das Darmbakterium „Escherichia Coli“ (E.coli). Bei Frauen haben die Krankheitserreger leichtes Spiel: Durch die nur vier Zentimeter kurze Harnröhre steigen die Bakterien besonders schnell in die Blase auf. Deshalb ist die unkomplizierte Harnwegsinfektion auch ein typisches Frauenleiden.